

Колоноскопия проводится при наличии анализов на инфекционную группу: RW, ВИЧ, гепатит В, С сроком давности не более 3 месяцев.

Для пациентов старше 65 лет, перед проведением исследований в состоянии медикаментозного сна обязательно наличие консультации врача-анестезиолога.

Два дня до исследования не есть овощи, фрукты, зелень, грибы, орехи, крупы, чёрный хлеб, большое количество мяса!

Схемы единовременной подготовки (накануне дня исследования) при выполнении колоноскопии в первой половине дня с 9.00 до 12.00.

Вариант 1. Фортранс

Последний прием пищи накануне дня исследования до 13⁰⁰. С 14⁰⁰ выпить 4 литра фортранса (развести 4 пакетика в 4 литрах воды, пить по 250 мл каждые 15 минут). Не ужинать. В день исследования очистительная клизма за 2-3 часа до исследования. Ознакомьтесь с инструкцией!

Вариант 2. Пикопреп.

Последний прием пищи накануне дня исследования до 13⁰⁰. В 16⁰⁰ для приготовления раствора, содержимое первой дозы растворяют в 0.25 литра воды, выпить. Затем в течение 1 часа выпить ещё 1.25 литра воды. В 20.00 повторить то же со второй дозой действующего вещества. Не ужинать.

Вариант 3. Мовипреп.

Последний прием пищи накануне дня исследования до 13⁰⁰. В 16⁰⁰ для приготовления 1 литра раствора, содержимое первой дозы растворяют в 1.0 литра воды, выпить в течение 1 часа. Затем в течение 1 часа выпить ещё 0.5 литра воды. В 20.00 повторить то же со второй дозой действующего вещества. Не ужинать.

Вариант 4. Эзиклен.

Последний приём пищи накануне дня исследования до 13⁰⁰. В 16⁰⁰ первую дозу препарата растворить в 0.5 литра воды и выпить в течение

30-60 минут, затем в течение 1 часа выпить ещё **1 литр** воды. В 20.00 повторить то же со второй дозой препарата. Не ужинать.

Схемы **дробной подготовки** при выполнении **колоноскопии** во второй половине дня с **13.00 до 15.00** предполагают приём **первой** (половинной) дозы препаратов накануне вечером с **18.00**, а **второй** дозы в день исследования с 6.00 до 8.00. Не ужинать накануне и не завтракать в день обследования.

В случае запоров принимать касторовое масло по 40 г 1 раз в сутки или форлакс по 1 дозе 1 раз в сутки столько дней, по сколько дней бывают задержки стула.

!!!! При проведении исследования в состоянии медикаментозного сна в день исследования строго не есть и не пить, вождение авто запрещено.